

Kiepenkerl Rieger-Hofmann Blumenwiese

Stand: März 2019

Zusammensetzung

Gräser 50 %:

Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), *Alopecurus pratensis* (Wiesen-Fuchsschwanz), *Anthoxanthum odoratum* (Gewöhnliches Ruchgras), *Arrhenatherum elatius* (Glatthafer), *Briza media* (Gewöhnliches Zittergras), *Bromus erectus* (Aufrechte Trespe), *Bromus hordeaceus* (Weiche Trespe), *Cynosurus cristatus* (Weide-Kammgras), *Festuca brevipila* (Raublätriger Schwingel), *Festuca guestfalica* (ovina) (Schafschwingel), *Festuca pratensis* (Wiesenschwingel), *Festuca rubra* (Horst-Rotschwingel), *Helictotrichon pubescens* (Flaumiger Wiesenhafer), *Poa angustifolia* (Schmalblättriges Rispengras), *Poa pratensis* (Wiesen-Rispengras), *Trisetum flavescens* (Goldhafer)

Blumen und Kräuter inkl. Leguminosen: 50 %:

Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe), *Agrimonia eupatoria* (Kleiner Odermennig), *Anthriscus sylvestris* (Wiesen-Kerbel), *Betonica officinalis* (Heilziest), *Campanula glomerata* (Knäuel-Glockenblume), *Campanula patula* (Wiesen-Glockenblume), *Campanula rotundifolia* (Rundblättrige Glockenblume), *Carum carvi* (Wiesen-Kümmel), *Centaurea cyanus* (Kornblume), *Centaurea jacea* (Wiesen-Flockenblume), *Centaurea scabiosa* (Skabiosen-Flockenblume), *Crepis biennis* (Wiesen-Pippau), *Daucus carota* (Wilde Möhre), *Galium album* (Weißes Labkraut), *Galium verum* (Echtes Labkraut), *Galium wirtgenii* (Wirtgen-Labkraut), *Geranium pratense* (Wiesen-Storchschnabel), *Heracleum sphondylium* (Wiesen-Bärenklau), *Hypericum perforatum* (Echtes Johanniskraut), *Hypochaeris radicata* (Gewöhnliches Ferkelkraut), *Jasione montana* (Berg-Sandglöckchen), *Knautia arvensis* (Acker-Witwenblume), *Lathyrus pratensis* (Wiesen-Platterbse), *Leontodon hispidus* (Rauer Löwenzahn), *Leucanthemum ircutianum/vulgare* (Wiesen-Margerite), *Lotus corniculatus* (Hornschotenklee), *Lychnis flos-*

cuculi (Kuckucks-Lichtnelke), Malva moschata (Moschus-Malve), Medicago lupulina (Gelbklee), Papaver dubium (Saatmohn), Papaver rhoeas (Klatschmohn), Pimpinella major (Große Bibernelle), Pimpinella saxifraga (Kleine Bibernelle), Plantago lanceolata (Spitzwegerich), Plantago media (Mittlerer Wegerich), Primula veris (Echte Schlüsselblume), Prunella vulgaris (Gewöhnliche Braunelle), Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß), Ranunculus bulbosus (Knolliger Hahnenfuß), Rhinanthus minor (Kleiner Klappertopf), Rhinanthus serotinus (Großer Klappertopf), Rumex acetosa (Wiesen-Sauerampfer), Rumex thysiflorus (Rispen-Sauerampfer), Salvia pratensis (Wiesen-Salbei), Sanguisorba minor (Kleiner Wiesenknopf), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Scorzoneroide autumnalis (Herbst-Löwenzahn), Silene dioica (Rote Lichtnelke), Silene vulgaris (Gewöhnliches Leimkraut), Stellaria graminea (Gras-Sternmiere), Tragopogon pratensis (Wiesen-Bocksbart), Vicia cracca (Vogelwicke), Vicia sepium (Zaunwicke)

Quelle: www.rieger-hofmann.de

(„Mischungsanteile in Gewichtsprozent: Analyse auf Anfrage, da unterschiedliche Mischungen aus 8 verschiedenen Produktionsräumen“)

→ Rieger-Hofmann gibt auf seiner Seite obige Arten als Mischungspartner an, die Zusammensetzung variiert aber je nach Produktionsraum. Das 50/50 Verhältnis von Gräsern und Kräutern bleibt dabei gleich. Detaillierte Auflistung auf www.rieger-hofmann.de)